



PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS BACTERIANA

Vd necesita prevenir el desarrollo de una endocarditis bacteriana (EB) por

- Endocarditis previa
- Llevar una prótesis valvular
- Padecer una cardiopatía congénita cianótica
- Haber sido sometido a cirugía de cardiopatía congénita con cortocircuito I-D
- *Padecer una valvulopatía moderada (estenosis o insuficiencia)*
- *Por padecer una miocardiopatía hipertrófica obstructiva*
- *Por tener una cardiopatía congénita no incluida en apartados anteriores*

Nota: en cursiva riesgo moderado

Si se somete a cualquiera de los procedimientos siguientes

Intervenciones sobre mucosa respiratoria: Tonsilectomía, adenoidectomía, broncoscopio rígido siempre y flexible en grupo de alto riesgo, y cirugía sobre la mucosa respiratoria

Intervenciones sobre mucosa urinaria: Prostatectomía, dilatación de uretra, cistoscopia, cirugías sobre mucosa urinaria.

Intervenciones sobre mucosa digestiva: Procedimientos que hagan sangrar la mucosa oral, dilatación esofágica, esclerosis de varices, técnicas endoscópicas, y cirugía sobre mucosa digestiva.

Desbridamiento de tejido cutáneo infectado

Cirugía cardíaca abierta.

Sólo en pacientes de alto riesgo

- Parto vaginal (sobre todo si existe alguna infección asociada),
- Histerectomía vaginal
- Eco transesofágico

Si va a someterse a **manipulaciones dentales** le recomendamos una de las pautas siguientes

- **Amoxicilina** 2 gr vía oral, 1 h antes del procedimiento
- **Ampicilina** 2 gr iv, 30 min antes (si no puede tomar medicación oral)
- **si se es alérgico a antibióticos betalactámicos debe emplear una hora antes**
 - **Claritromicina** 500mg , o
 - **Azitromicina** 500mg, o
 - **Clindamicina** 600 mg

Si va a someterse a **manipulaciones ginecológicas** o **colono-rectales** o **urológicas** le recomendamos

- **Grupo alto riesgo:** Ampicilina 2 gr iv 30 min antes + Gentamicina 1.5 mgr/kg iv 30 min antes + Ampicilina 1gr o amoxicilina 1gr 6 horas después.
Si es alérgico a antibióticos debe usar Vancomicina 1gr iv (terminando 30min antes) + Gentamicina 1.5 mgr/kg
- **Grupo riesgo moderado:** Amoxicilina 2gr o Ampicilina 2gr. En alérgicos Vancomicina 1 gr.

Para otras intervenciones consulte a su médico y a su cardiólogo

Nota muy importante

Deberá mostrar esta hoja al personal sanitario que vaya a realizarle una prueba o actuación que pueda hacerle sangrar, o que implique introducir un catéter o dispositivo exploratorio por vena o por aparato digestivo o urinario, así como a su dentista.