

## Intervención en paciente anticoagulado con Sintrom que precisa terapia puente con Heparina Sódica Intravenosa

D. \_\_\_\_\_

Fecha de la cirugía \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firmado Dr./Dra. \_\_\_\_\_

**Usted es un paciente que está realizando tratamiento con anticoagulantes y que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. La pauta de anticoagulación que debe realizar los días previos a la cirugía es:**

- ✓ Debe **ingresar tres días** antes de la intervención.
- ✓ El día del **ingreso, NO** tomará **SINTROM**.
- ✓ Durante el ingreso se seguirá el Protocolo de terapia puente con heparina sódica intravenosa.

**Tarjeta terapia puente con Heparina Sódica Intravenosa.  
Instrucciones para el paciente. ii No olvide traer esta hoja el día del ingreso !!**

## **Pacientes anticoagulados con Sintrom que precisan ingreso y terapia puente con Heparina Sódica Intravenosa.**

1. Todos los pacientes con prótesis valvulares metálicas mitrales, tricúspides o múltiples.
2. Los pacientes con prótesis aórticas metálicas bivalva (St Jude, ATS) o de Medtronic-Hall, que reúnen alguna de las condiciones siguientes, que constituyen factores de riesgo tromboembólico.
  - ✓ Fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) <35%.
  - ✓ Insuficiencia Cardíaca previa.
  - ✓ Fibrilación auricular.
  - ✓ Embolia arterial previa.
  - ✓ Trombosis protésica previa.
  - ✓ Cirugía oncológica.
  - ✓ Estado hipercoagulabilidad documentado.
  - ✓ Embarazo.
  - ✓ Ciertas prótesis "antiguas": Bjork-Shiley, Lillehei Kaster, Omniscience, Starr Edwards.

**Pauta previa de anticoagulación: \_\_\_\_\_ mg de Sintrom a la semana.**

## Intervención en paciente anticoagulado con Sintrom que precisa terapia puente con Clexane en dosis de anticoagulación

D. \_\_\_\_\_

Fecha de la cirugía \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firmado Dr./Dra. \_\_\_\_\_

**Usted es un paciente que está realizando tratamiento con anticoagulantes y que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. La pauta de anticoagulación que debe realizar los días previos a la cirugía es:**

- ✓ **Suspender el SINTROM 3 días antes** de la intervención
- ✓ Comenzar a ponerse **CLEXANE SUBCUTÁNEO** (dosis 1 mg/kg/12 horas; ver criterios de exclusión al dorso).
  - ✓ **Tres días** antes de la intervención **CLEXANE** SC \_\_\_\_\_ mg a las 9 horas y a las 21 horas.
  - ✓ **Dos días** antes de la intervención **CLEXANE** SC \_\_\_\_\_ mg a las 9 horas y a las 21 horas.
  - ✓ **Un día** antes de la intervención **CLEXANE** SC \_\_\_\_\_ mg SOLO a las 9 horas.
  - ✓ El día de la **intervención** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **NO PONER CLEXANE.**

**Tarjeta terapia puente con HBPM dosis de anticoagulación.  
Instrucciones para el paciente. ii No olvide traer esta hoja el día del ingreso !!**

**Criterios de EXCLUSIÓN: Obesidad mórbida o Insuficiencia Renal Crónica (Cr >1.5 mg/dl) si no es posible monitorizar factor anti-Xa.**

**Pacientes anticoagulados con Sintrom que precisan terapia puente con Heparina de bajo peso molecular en dosis de anticoagulación sin ingreso previo.**

**1.** Fibrilación auricular y alto riesgo tromboembólico como:

- ✓ Embolia arterial previa.
- ✓ EM reumática.
- ✓ Trombo AI.
- ✓ Ablación con radiofrecuencia de la aurícula izquierda en los 3 meses previos.

**2.** Ablación con radiofrecuencia <3 meses de AI/VI.

**3.** Embolia pulmonar repetición o <3 meses.

**4.** TVP de repetición o <3 meses.

**5.** Otros fenómenos trombóticos de alto riesgo independientemente de su antigüedad:

- ✓ Budd-Chiari.
- ✓ Trombosis senos venosos.
- ✓ Trombosis vena porta.

**6.** Embolia arterial previa y:

- ✓ Foramen oval permeable.
- ✓ Trombo AI/VI persistente.
- ✓ Fibroelastoma.
- ✓ Valvulopatía mitral aunque esté en ritmo sinusal.

**7.** Embolia arterial previa < 3 meses.

**Pauta previa de anticoagulación: \_\_\_\_\_ mg de Sintrom a la semana.**

D. \_\_\_\_\_

Fecha de la cirugía \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Firmado Dr./Dra. \_\_\_\_\_

**Usted es un paciente que está realizando tratamiento con anticoagulantes y que va a ser sometido a una intervención quirúrgica. La pauta de anticoagulación que debe realizar los días previos a la cirugía es:**

- ✓ **Suspender el SINTROM 3 días antes** de la intervención.
- ✓ **Dos días** antes de la intervención **CLEXANE** SC 40 mg/día.
- ✓ **Un día** antes de la intervención **CLEXANE** SC 40 mg/día (al menos 12 horas antes de la hora prevista de cirugía).
- ✓ El día de la **intervención** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **NO PONER CLEXANE.**

## Pacientes que no precisan terapia puente.

1. Puede interrumpirse Sintrom durante un máximo de 3 días (si se exceden los 3 días pasan al protocolo A) a los pacientes con prótesis aórticas metálicas bivalva (St Jude, ATS) o de Medtronic-Hall SIN NINGUNO de los siguientes factores de riesgo tromboembólico:

- ✓ Fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) <35%.
- ✓ Insuficiencia Cardíaca previa
- ✓ Fibrilación auricular.
- ✓ Embolia arterial previa.
- ✓ Trombosis protésica previa.
- ✓ Cirugía oncológica.
- ✓ Estado hipercoagulabilidad documentado.
- ✓ Embarazo.
- ✓ Ciertas prótesis "antiguas": Bjork-Shiley, Lillehei Kaster, Omniscience, Starr Edwards.

2. Puede interrumpirse Sintrom durante un máximo de 7 días (si se exceden los 7 días pasan al protocolo A o B) a los pacientes que NO PRESENTAN NINGUNA de las siguientes situaciones de riesgo tromboembólico:

- ✓ Fibrilación auricular y alto riesgo tromboembólico como:
  - . Embolia arterial previa.
  - . EM reumática.
  - . Trombo AI.
  - . Ablación con radiofrecuencia de la aurícula izquierda en los 3 meses previos.
- ✓ Ablación con radiofrecuencia <3 meses de AI/VI.
- ✓ Embolia pulmonar repetición o <3 meses.
- ✓ TVP de repetición o <3 meses.
- ✓ Otros fenómenos tromboticos de alto riesgo, independientemente de su antigüedad:
  - . Budd-Chiari.
  - . Trombosis senos venosos.
  - . Trombosis vena porta.
- ✓ Embolia arterial previa y:
  - . Foramen oval permeable.
  - . Trombo AI/VI persistente.
  - . Fibroelastoma.
  - . Valvulopatía mitral aunque esté en ritmo sinusa.
- ✓ Embolia arterial previa < 3 meses.

**Pauta previa de anticoagulación:** \_\_\_\_\_ **mg de Sintrom a la semana.**