

Recomendación Al Paciente Tras Cirugía Por Obstrucción De Glándula De Bartolino

Higiene

- Es preciso que mantenga la herida limpia y seca. Se recomienda ducharse a diario, incluyendo la herida (evitando el baño de inmersión), con agua y jabón neutro, y después secarse bien con una toalla con pequeños toques o al aire.

Actividad

- La zona afectada puede estar inflamada durante unos días, utilice ropa cómoda que no comprima o presione.
- Se recomienda utilizar ropa interior de algodón.

Sangrado

- Puede tener un sangrado escaso durante los primeros días

Tratamiento

- Siga las instrucciones del informe del alta en la toma de la medicación post-operatoria, curas y retirada de puntos.
- Para la inflamación, puede aplicar hielo local, nunca directamente sobre la herida, durante 15-20 minutos, 2-3 veces al día.

En caso de presentar aumento de dolor que no cede con la analgesia pautada, aumento significativo del sangrado aparición de mal olor o fiebre mayor de 38º, acuda a su médico o al servicio de urgencias.



Portal del Paciente Quirónsalud
Accede online a tus resultados y gestiona tus citas en [quironsalud.es](https://www.quironsalud.es) o en nuestra App.



Hospital Universitario

Fundación Jiménez Díaz

Grupo  **quirónsalud**